

FONDER UNE FAMILLE AU SEIN DU COUPLES DISCORDANT VIH : UN REVE REALISE SOUS SUIVI MÉDICAL

Bensadoun FZ., kouiadbelkadi A., Belabess Fz., Bensaad M., Merzoug A. Merabet N, Mouffok N

Service d'Infectiologie -CDR IST / VIH-Sida ; Oran / Algérie

INTRODUCTION



Le SIDA est un véritable drame humain touchant la sexualité, obligeant chacun de nous à répondre à l'attente de nos patients PVVIH vivant avec des partenaires sains.

OBJECTIF

Décrire le profil épidémiologique et sérologique des patients sérodifférents VIH et démontrer l'intérêt de l'aide médicale pour réduire la contamination VIH dans le couple.

RESULTATS

120 Couples discordants VIH




Prédominance Masculine dans 2/3 des couples

➤ l'âge moyen des patients infectés par le VIH { **Hommes = 27-68 ans**
Femmes = 22-39 ans

➤ Découverte de l'infection à VIH par dépistage ou bilan prénuptial


Soutien et Suivi Médical



MATERIELS ET METHODES


Etude descriptive observationnelle de 120 couples discordants VIH suivi au CDR d'Oran /Algérie de 2017 à mars 2022 . Sérologie VIH confirmée chez les patients infectés et infirmée chez les non infectés au sein de chaque couple.

Vie Sexuelle dans le couples Discordant



01 Cas de Contamination : Séroconversion 09 après mariage

155 Grossesses dans les Couples Discordants



Discussion

- L'épidémie VIH est toujours en ascension avec le nombre des couples discordants qui augmente dans notre région comme dans le monde.
- Nette prédominance masculines dans les 2/3 des couples discordants dans notre étude comme dans le Maghreb .
- Toutes les tranches d'ages sont touchées.
- Transmission sexuelle reste toujours importante à 96 % chez nos patients .
- Suivi médical est fait chez nos patients infectés jusqu'à la négativation de leurs charge virale et le maintien d'une bonne restauration immunitaire
- Le soutien des partenaires non infectés est nécessaire avec des contrôles sérologiques tous les 03 mois
- Le maintien de préservatifs jusqu'à avoir contrôlé la charge virale a conduit à Zéro contamination dans le couple
- Seulement 01 cas de contamination rapporté par mauvaise observance du traitement et refus de préservatif
- Le désir de grossesse n'a pas empêcher les femmes de le réaliser grâce à un suivi et un accompagnement médical de chaque membre du couple discordant
- Les résultats de notre étude se rapproche de celles faites au Maghreb et en Afrique

CONCLUSION

Le SIDA modifie aujourd'hui les comportements individuels en tant que fléau de la fin du XX ème siècle et le corps médical n'est pas insensible à cette influence. Par conséquent, ce dernier s'appuie sur les données de la recherche scientifique et l'état actuel de la question car le nombre de couples discordants VIH est en croissance avec un désir sérieux de fonder une famille pour certains et un conflit conjugal pour d'autres. Un soutien psychologique avec une aide médicale s'avère nécessaire pour aider cette catégorie afin de combattre les méfaits de cette maladie et préserver une vie de famille heureuse

